

**MYŚLIWY**  
**PAMIĘTAJ!!!**

*Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.*

**Podjejrzasz ASF ?  
znalazłeś padłego  
dzika ?  
ZADZWOŃ!**



Pieczętka  
PIW z numerem  
telefonu

**POWIATOWY  
INSPEKTORAT WETERYNARII**  
w Pułtusk  
ul. Daszyńskiego 19/57  
06-100 Pułtusk  
tel. (23) 692 55 84

**INFORMACJA  
DLA MYŚLIWYCH  
AFRYKAŃSKI  
POMÓR ŚWIŃ**



**Inspekcja Weterynaryjna**

# !!! MYŚLIWI !!!

## !!! ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ !!!!

### Jesteś myśliwym?

**Polując zwracaj uwagę na zachowanie zwierząt dzikich, a w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w szczególności na zachowanie dzików!**

**Afrykański pomór świń to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.**

### **Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF**

Wystąpienie tej choroby powoduje poważne straty ekonomiczne w przemyśle mięsny oraz hodowli - powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

### !!! Jesteś myśliwym hodującym świnie?!

**Nie kuś losu, nie poluj !!!**

### Po zauważeniu u dzików **objawów wskazujących na chorobę**, takich jak:

- zwiększone padnięcia;
- osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
- sinica skóry uszu, brzucha, i boków ciała, liczne wybroczyny na skórze;
- duszność, pienisty lub krwisty wypluw z nosa;
- biegunka, często z domieszką krwi;

**oraz, każdy przypadek znalezienia padłego dzika**

### **zglaszaj ten fakt do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii!!**

### **Zachowaj daleko idącą ostrożność w postępowaniu z odstrzelonym lub padłym dzikiem:**

- nie patrosz padłego lub odstrzelonego dzika, który wykazywał objawy choroby w łowisku;
- unikaj patroszenia wszystkich odstrzelonych dzików w łowisku, staraj się jak najszybciej przewieźć je do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

- jeżeli patroszenie jest niezbędne wykonaj je na folii, lub innym szczelnym materiale;
- podczas każdego polowania używaj środka biobójczego do dezynfekcji miejsca patroszenia, a także miejsc zanieczyszczonych krwią dzika (np. w trakcie przeciągania tuszy dzika do środka transportu itp.);
- umieszczaj patrochy i folię, na której dokonano patroszenia w szczelnym pojemniku lub worku;
- po wykonaniu wszystkich czynności na zwierzętach w łowisku zdezynfekuj sprzęt, którego używałeś do tego celu, zdezynfekuj koła środka transportu, dłonie, obuwie, itp.

### **Zwróć szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie środka transportu używanego po przewożeniu odstrzelonych dzików, a mianowicie:**

- środek transportu powinien być szczelny, wyłożony materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji;
- nie powinien być używany w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;